

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących objawów:

- Niewyjaśnione nudności
- Ból żołądka
- Zażółcenie skóry lub białek oczu
- Wymioty
- Ciemno zabarwiony moczu

Jeśli pacjentka jest wieku rozrodczym, nie może być w ciąży przed rozpoczęciem stosowania leku Aubagio®.

Lekarz może poprosić o wykonanie testu ciążowego przed przepisaniem leku Aubagio®. Ponadto, pacjentki w wieku rozrodczym powinny stosować skuteczną metodę antykoncepcji uzgodnioną z lekarzem prowadzącym.

Lek Aubagio® nie wpływa na skuteczność doustnych hormonalnych środków antykoncepcyjnych. Należy poinformować lekarza prowadzącego jeśli pacjentka zamierza zmienić metodę antykoncepcji lub zaprzestać stosowania antykoncepcji w trakcie leczenia lekiem Aubagio®.

Jeśli pacjentka podejrzewa, że może być w ciąży, powinna niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym

Należy pamiętać o konieczności wykonywania wszystkich badań krwi zleconych przez lekarza prowadzącego oraz kontrolowania ciśnienia tętniczego krwi. Należy także pamiętać, aby na każdą wizytę u lekarza przynosić ze sobą listę wszystkich stosowanych leków oraz chorób występujących u pacjenta.

Imię i nazwisko pacjenta: _____

Data przepisania leku Aubagio® po raz pierwszy: __/__/____

Nazwa ośrodka: _____

Imię i nazwisko lekarza prowadzącego: _____

Numer telefonu lekarza prowadzącego: _____