

1 raz na dobę

AUBAGIO[®]
(teryflunomid) 14 mg
tabletki powłokane

AUBAGIO jest dostępny w tabletkach 14mg i 7mg.

PORADNIK DLA LEKARZA DOTYCZĄCY EDUKACJI PACJENTÓW



- Proszę omówić z pacjentem zagrożenia opisane w niniejszym poradniku
- Proszę zapoznać się z ChPL, aby uzyskać szczegółowe informacje o produkcie leczniczym

| | | | |
|--|--|------------------|--|
| Imię i nazwisko pacjenta: | | Wiek pacjenta: | |
| Data pierwszej wizyty: | Płeć pacjenta: <input type="checkbox"/> Mężczyzna <input type="checkbox"/> Kobieta | | |
| Data przepisania produktu leczniczego po raz pierwszy: | | Dzisiejsza data: | |

PL.EDU.TER.21.08.01

DO OMÓWIENIA



Morfologia krwi

- Ryzyko zmniejszenia liczby krwinek (dotyczy głównie krwinek białych)
- Wykonanie morfologii krwi przed rozpoczęciem leczenia i w razie konieczności na podstawie klinicznych objawów przedmiotowych lub podmiotowych okresowo w trakcie leczenia



- Ryzyko (ciężkich) zakażeń (oportunistycznych)
- Konieczność kontaktu z lekarzem w przypadku wystąpienia objawów zakażenia lub w przypadku gdy pacjent przyjmuje inne leki wpływające na układ odpornościowy
- Rozważenie procedury przyspieszonej eliminacji w przypadku poważnego zakażenia



Ciężenie tętnicze

- Ryzyko nadciśnienia tętniczego
- Kontrola ciśnienia tętniczego przed rozpoczęciem leczenia i okresowo w trakcie leczenia
- Konieczność kontaktu z lekarzem w przypadku wystąpienia nadciśnienia tętniczego



- Ryzyko wpływu na wątrobę
- Kontrola czynności wątroby przed rozpoczęciem leczenia i okresowo w trakcie leczenia
- Objawy przedmiotowe i podmiotowe choroby wątroby
- Konieczność kontaktu z lekarzem niezwłocznie w przypadku wystąpienia objawów



Dla kobiet w wieku rozrodczym, w tym nastolatków

- Potencjalne ryzyko działania teratogennego
- Przed rozpoczęciem leczenia należy sprawdzić, czy pacjentka nie jest w ciąży
- Sprawdzić możliwość ciąży u wszystkich kobiet w wieku rozrodczym, w tym pacjentek poniżej 18 lat
- Należy wykluczyć ciążę
- Konieczność stosowania skutecznej antykoncepcji przed rozpoczęciem leczenia, w jego trakcie oraz po jego zakończeniu
- Konieczność niezwłocznego kontaktu z lekarzem w przypadku przerwania stosowania antykoncepcji lub przed zmianą środka antykoncepcyjnego
- Konieczność natychmiastowego przerwania stosowania produktu leczniczego Aubagio i kontaktu z lekarzem w przypadku ciąży
- Rozważenie procedury przyspieszonej eliminacji

Rodzice / opiekunowie dziecka płci żeńskiej

- Konieczność kontaktu rodziców/opiekunów dziewczynek po wystąpieniu u nich miesiączki

DO PRZEKAZANIA

Karta informacyjna dla pacjenta:

- Proszę wypełnić dane kontaktowe na karcie pacjenta i w razie konieczności je korygować
- Należy przekazać pacjentowi Kartę informacyjną dla pacjenta i regularnie omawiać jej treść podczas każdej konsultacji **co najmniej raz w roku w trakcie leczenia**
- Należy poinformować pacjenta, aby pokazywał tę Kartę każdemu lekarzowi lub pracownikowi fachowego personelu medycznego (np. w sytuacjach nagłych)
- Należy przypomnieć pacjentowi, aby kontaktował się z lekarzem w razie objawów ze strony wątroby lub objawów zakażenia, które opisano w Karcie informacyjnej dla pacjenta
- Przed leczeniem, a następnie w regularnych odstępach czasu udzielać kobietom w wieku rozrodczym, w tym nastolatkom/ich rodzicom/opiekunom, porad i informacji na temat potencjalnego ryzyka dla płodu.

Pacjent został poinformowany o powyższych zagrożeniach i korzyściach związanych z leczeniem i rozumie je.

Imię i nazwisko lekarza
przepisującego produkt leczniczy: _____

Podpis lekarza przepisującego
produkt leczniczy: _____

PL.EDU.TER.21.08.01