

<p style="text-align: center;"><b>Ważne informacje dotyczące bezpiecznego i skutecznego stosowania leku Multaq®</b> <b>Informacja dla pacjentów</b></p>
---

Szanowna Pani, Szanowny Panie,

Lek Multaq® zawiera jako substancję czynną dronedaron. Lek ten należy do grupy leków nazywanej lekami antyarytmicznymi (stosowanymi w leczeniu nieregularnego rytmu serca). Lek wydawany jest z przepisu lekarza pacjentom z migotaniem przedsionków po skutecznej kardiowersji celem utrzymania prawidłowego rytmu serca.

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Multaq® należy zwrócić szczególną uwagę na poniższe zagadnienia związane z bezpieczeństwem stosowania leku:

- Należy starannie zapoznać się z ulotką informacyjną dołączoną do opakowania
- Leku Multaq® nie należy przyjmować z niektórymi innymi lekami
- W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą
- Jeżeli leczy się Pani/ Pan także u innych lekarzy, należy ich poinformować, że przyjmuje Pani/ Pan lek Multaq®
- Podczas stosowania leku Multaq® nie należy spożywać soku grejpfrutowego.

Należy koniecznie poinformować lekarza o wszystkich zdarzeniach, które mają związek z Pani/ Pana zdrowiem.

**W szczególności należy skonsultować się z lekarzem, jeżeli :**

- w czasie ostatnich trzech miesięcy był/a Pan/i przyjęty/a do szpitala z objawami :
  - narastających obrzęków kończyn dolnych lub
  - nasilającej się duszności lub niewyjaśnionej infekcją kaszlu w spoczynku lub przy minimalnym wysiłku fizycznym;
- wystąpiło uczucie duszności lub kaszel, nawet w czasie minimalnego wysiłku fizycznego;
- wystąpiły objawy nawracającego migotania przedsionków, takie jak palpacje, uczucie szybkich lub nieregularnych uderzeń serca.

Jeśli zauważył/a Pan/i wystąpienie jakichkolwiek objawów dotyczących czynności wątroby, takich jak bóle brzucha, brak apetytu, nudności, wymioty, zażółcenie skóry i oczu (żółtaczka), ciemne zabarwienie moczu, uczucie zmęczenia (szczególnie z towarzyszącymi objawami wymienionymi powyżej), należy natychmiast powiedzieć o nich lekarzowi.

Prosimy o poinformowanie lekarza o jakichkolwiek innych objawach, które wystąpią w czasie leczenia lekiem Multaq®. Wystąpienie powyższych objawów nie musi powodować konieczności zaprzestania stosowania leku Multaq®. Jednakże w trosce o bezpieczeństwo konieczne jest poinformowanie lekarza, który podejmie decyzję w oparciu o gruntowną ocenę Pani/Pana zdrowia.

Multaq® powoduje interakcje z wieloma lekami. Oznacza to, że nie można go z tymi lekami stosować lub stosować pod ścisłą kontrolą lekarza. Należy koniecznie poinformować lekarza o wszystkich innych lekach, które Pani/Pan przyjmuje. W szczególności należy skonsultować się z lekarzem, jeżeli stosuje Pani/Pan którykolwiek z poniższych leków (w szczególności antybiotyków, leków przeciwgrzybiczych oraz przeciwwirusowych):

- Ketokonazol, Fungores, Ketokonazole, Nizoral lub inny lek zawierający jako substancję czynną *ketokonazol*
- Trioxal, Orungal, Itragen lub inny lek zawierający jako substancję czynną *itraconazol*
- Vfend lub inny lek zawierający jako substancję czynną *worykonazol*
- Noxafil lub inny lek zawierający jako substancję czynną *posakonazol*
- Ketek lub inny lek zawierający jako substancję czynną *telitromycynę*
- Klacid, Klacid Uno, Klabax (Klaristat), Fromilid, Klarmin, Klabion, Taclar, Lekoklar lub inny lek zawierający jako substancję czynną *klarytromycynę*
- Serzone lub inny lek zawierający jako substancję czynną *nefazodon*
- Norvir, Kaletra lub inny lek zawierający jako substancję czynną *rytonawir*
- Pradaxa lub inny lek zawierający jako substancję czynną *dabigatran*